

# Craneotomía o craniectomía (Craniotomy or craniectomy)



## ¿Qué es la craneotomía o craniectomía?

Una craneotomía o craniectomía es una intervención quirúrgica para extraer parte del hueso (colgajo óseo) del cráneo. Un médico hace esto para poder operar en el cerebro.

- Si el colgajo óseo se reemplaza después de la cirugía, se llama craneotomía.
- Si el colgajo óseo no se reemplaza; se llama craniectomía.

## ¿Por qué necesita mi hijo una craneotomía o craniectomía?

Su hijo puede necesitar una craneotomía o craniectomía para:

- Aliviar la presión dentro del cráneo.
- Extirpar un tumor cerebral o un coágulo sanguíneo.
- Tratar otros problemas en el cerebro.

## ¿Qué pasa después de la craneotomía o craniectomía?

Estas son algunas pautas generales a seguir:

- Para cerrar la herida (incisión) de su hijo se pueden utilizar suturas (puntos), *Steri-Strips* (una cinta adhesiva especial) o grapas.
  - Es posible que deba aplicar un ungüento antibiótico en la herida en casa. El enfermero de su hijo puede mostrarle cómo hacerlo.
  - Si no se requiere ungüento, mantenga la herida limpia y seca.,
- Bañe o duche a su hijo y lávele el cabello según las recomendaciones del médico. Enjuague bien el cabello con agua limpia.
- Para prevenir infecciones, su hijo no debe meterse en piscinas o jacuzzis hasta que el médico lo autorice.
- Proteja la herida del sol durante 6 meses usando bloqueador solar SPF 30 o un sombrero.
- Es posible que su hijo tenga inflamación, leve o moderada, alrededor de la cara, la cabeza y los ojos.

## ¿Qué más necesito saber?

- Dele el medicamento analgésico que le recomendó el médico. No le dé ibuprofeno (Advil, Motrin o una marca comercial menos costosa).
- Si su hijo toma medicamento para las convulsiones, déselo según las recomendaciones de su médico.

## ¿Cuándo debo llamar al médico?

Llámelo **de inmediato** si la herida:

- Supura líquido.
- Se hincha, se pone roja o se siente caliente al tacto.
- Empieza a abrirse.
- Duele más de lo normal.

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya de inmediato a la sala de emergencias más cercana

# Craneotomía o craniectomía, continuación

---

Igualmente, llámelo **de inmediato** si su hijo:

- Está más irritable (molesto) que de costumbre.
- Tiene náuseas o vómitos.
- Está más cansado o decaído.
- Parece estar desorientado.
- Tiene fiebre de 101°F o más.

Igualmente, llame al médico si tiene preguntas o inquietudes sobre cómo se ve o se siente su niño.

**Esta hoja informativa contiene sólo información general. Hable con el médico de su niño o con uno de los integrantes de su equipo de atención médica sobre el cuidado específico para él.**